



CLENPIQ™

(picosulfato de sodio, óxido de magnesio y ácido cítrico anhidro) Solución oral
10 mg/3.5 g/12 g por frasco de 160 ml


ADMINISTRACIÓN DE CLENPIQ

PASOS PARA COMPLETAR LA PREPARACIÓN

Régimen de dosis del día anterior

Tarde/primeras horas de la noche anterior


ENTRE LAS 4 P. M. Y LAS 6 P. M.



Tome 40 oz (5 tazas) de líquidos transparentes*.
Deje de ingerir líquidos durante las 5 horas siguientes.

Noche anterior

ENTRE LAS 10 P. M. Y LAS 12 A. M.



Tome al menos 24 oz (3 tazas) de líquidos transparentes durante las 5 horas siguientes.
Deje de ingerir líquidos 2 horas antes de su colonoscopia o según se lo aconseje el médico.



La hidratación es importante y forma parte de la preparación. Asegúrese de hidratarse antes de tomar CLENPIQ, mientras toma CLENPIQ y después de terminar CLENPIQ.

Asistencia para la preparación

Use la asistencia para la preparación como guía para completar su preparación.

La fecha y la hora de su colonoscopia es ____ / ____ / ____ : ____

Puede continuar hidratándose con líquidos transparentes hasta las ____ : ____ del día del procedimiento.

EL DÍA ANTERIOR A LA COLONOSCOPIA, deje de consumir todo tipo de alimentos sólidos y lácteos, y comience a hidratarse con líquidos transparentes.



Tarde/primeras horas de la noche anterior a su colonoscopia

4 P. M. a 6 P. M.

Tome un frasco de CLENPIQ
Tome CLENPIQ directamente del frasco

Luego, continúe hidratándose
Tome 5 tazas (de 8 oz cada una) de líquidos transparentes.

¡Marque las tazas a continuación a medida que las tome!



Comience: ____ : ____

Finalice: ____ : ____


Noche anterior a su colonoscopia

10 P. M. a 12 A. M.

Tome el otro frasco de CLENPIQ
Tome CLENPIQ directamente del frasco

Luego, continúe hidratándose
Tome al menos 3 tazas (de 8 oz cada una) de líquidos transparentes.

¡Marque las tazas a continuación a medida que las tome!



O MÁS

Comience: ____ : ____

Finalice: ____ : ____

*Si después de la primera dosis tiene hinchazón, inflamación o dolor intenso en el estómago, retrase la segunda dosis hasta que desaparezcan los síntomas. Consulte la página al dorso para obtener más información sobre CLENPIQ, la importancia de una dieta de líquidos transparentes y la hidratación.

INDICACIÓN

CLENPIQ es un medicamento recetado que se utiliza en adultos para limpiar el colon antes de una colonoscopia. CLENPIQ le induce diarrea para limpiar el colon. Limpiar el colon le ayuda a su médico a ver el interior del colon con mayor claridad durante la colonoscopia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No tome CLENPIQ si su médico le ha informado que padece de problemas renales graves, un bloqueo en el intestino (obstrucción intestinal), un orificio en la pared del estómago o de los intestinos (perforación intestinal), gran dilatación de los intestinos (megacolon tóxico), problemas para evacuar los alimentos y los líquidos del estómago (retención gástrica) o alergia a cualquiera de los ingredientes de CLENPIQ.
- CLENPIQ y otras preparaciones intestinales pueden producir efectos secundarios graves, lo que incluye pérdida seria de líquido corporal (deshidratación) y cambios en las sales de la sangre (electrólitos). Estos cambios pueden causar alteraciones en los latidos cardíacos que pueden provocar la muerte, convulsiones (esto puede ocurrir incluso aunque nunca haya tenido convulsiones) o problemas renales. Su probabilidad de presentar pérdida de líquido y cambios en las sales de la sangre con CLENPIQ es mayor si presenta problemas cardíacos, tiene problemas renales o toma diuréticos o antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Consulte la información de seguridad importante completa al dorso.



CLENPIQ™

(picosulfato de sodio, óxido de magnesio y ácido cítrico anhidro) Solución oral
10 mg/3.5 g/12 g por frasco de 160 ml

PREPARADO, LISTO, COMPLETE LA PREPARACIÓN

¿Qué es CLENPIQ?

CLENPIQ es un medicamento recetado que limpia el colon.
CLENPIQ viene preparado para que lo tome directamente del frasco. No es necesario mezclarlo ni diluirlo.
No refrigere ni congele CLENPIQ.

¿Qué trae la caja de CLENPIQ?



Dos frascos de CLENPIQ
(de 5.4 oz cada uno)



Una taza de 8 oz para tomar
líquidos transparentes



La Guía del medicamento para el paciente y
las Instrucciones de uso para que consulte

Comience a hidratarse

El día anterior a la colonoscopia, comience a hidratarse consumiendo solamente líquidos transparentes y deje de comer alimentos sólidos y lácteos.

Es importante hidratarse antes de tomar CLENPIQ, mientras toma CLENPIQ y después de terminar CLENPIQ. *Siga todas las instrucciones del médico.*

LÍQUIDOS TRANSPARENTES PERMITIDOS PARA HIDRATARSE

Agua	Ginger ale y otros refrescos
Café o té solo	Jugos transparentes, como jugo de manzana o de uva blanca
Caldo o consomé transparente	Gelatina sin sabor
Bebidas isotónicas	Barra congelada de jugo



LOS LÍQUIDOS NO DEBEN SER ROJOS NI MORADOS. NO CONSUMA ALCOHOL, JUGO CON PULPA, LECHE, CREMA, LECHE DE SOJA O SUSTITUTO DE CREMA NO LÁCTEO NI OTROS LÍQUIDOS QUE NO SEAN TRANSPARENTES.

La Guía del medicamento para el paciente y las Instrucciones de uso también están disponibles en www.CLENPIQ.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

- Es posible que su médico le realice análisis de sangre luego de que tome CLENPIQ para controlar la sangre y ver si hay cambios. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de estos síntomas como consecuencia de una gran pérdida de líquido corporal (deshidratación): vómitos, náuseas, hinchazón, mareos, cólicos en la zona del estómago (abdomen), orina menos frecuente de lo normal, problemas para tomar líquidos transparentes, problemas para tragar, convulsiones o problemas cardíacos.
- CLENPIQ puede causar úlceras en los intestinos o problemas intestinales (colitis isquémica). Informe a su médico de inmediato si presenta dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) o sangrado rectal.
- Los efectos secundarios más frecuentes de CLENPIQ incluyen náuseas, dolor de cabeza y vómitos. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de CLENPIQ. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

Le sugerimos informar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta, que incluye la Guía del medicamento, también disponible en www.CLENPIQ.com.